

《化学与环境》试卷 A

1. 在下列平衡常数表达式中, K_1^θ 、 K_2^θ 、 K_3^θ 的关系是:

$$\frac{1}{2} \text{N}_2(\text{g}) + \frac{3}{2} \text{H}_2(\text{g}) = \text{NH}_3(\text{g}) \quad K_2^\theta$$
$$\frac{1}{3}\text{N}_2(\text{g}) + \text{H}_2(\text{g}) = \frac{2}{3}\text{NH}_3(\text{g}) \quad K_3^\theta$$

- ① $K_1^\theta = K_2^\theta = K_3^\theta$
- ② $K_1^\theta = 2K_2^\theta = 3K_3^\theta$
- ③ $K_1^\theta = 1/2K_2^\theta = 1/3K_3^\theta$
- ④ $K_1^\theta = (K_2^\theta)^2 = (K_3^\theta)^3$
- ⑤ $K_1^\theta = (K_2^\theta)^{1/2} = (K_3^\theta)^{1/3}$

① 醋酸的电离常数增大, 溶液 pH 值增大;

② 醋酸的电离常数不变, 溶液 pH 值减小;

③ 醋酸的电离常数减小, 溶液 pH 值减小;

④ 醋酸的电离常数不变，溶液 pH 值增大；

3. 配制缓冲溶液 (PH=10) 应选用

- ① 2mol/L HAc ($pK_a=4.74$) + 2mol/L NaAc
- ② 2mol/L HCOOH ($pK_a=3.75$) + 2mol/L HCOONa
- ③ 2mol/L $NaHCO_3$ ($pK_a=10.25$) + 2mol/L Na_2CO_3
- ④ 0.5mol/L HCOOH + 0.5mol/L HCOONa

4. 难溶强电解质 A_4B ，在水溶液中达到平衡，此时， $c(A^+) = x \text{ mol/L}$ ， $c(B^{4-}) = y \text{ mol/L}$ ，则其 $K_{sp}^\ominus$ 可以表达为：

- ① x^4y ② $(4x)^4$ ③ xy ④ $x^4 \cdot 1/2y$

5. Ag_2CrO_4 固体加到 Na_2S 溶液中, 大部分 Ag_2CrO_4 转化为 Ag_2S , 其原因是:

- ① S^{2-} 的半径比 CrO_4^{2-} 的半径小
- ② CrO_4^{2-} 的氧化性比 S^{2-} 的强
- ③ Ag_2CrO_4 的溶解度比 Ag_2S 的小
- ④ $K_{sp}^{\theta}(Ag_2S)$ 远小于 $K_{sp}^{\theta}(Ag_2CrO_4)$

6. 在水溶液中 $[\text{Zn}(\text{NH}_3)_4]^{2+}$ 比 $[\text{Zn}(\text{H}_2\text{O})_4]^{2+}$ 稳定, 这意味着 $[\text{Zn}(\text{NH}_3)_4]$ 的:

- ① 酸性较强
- ② 累计不稳定常数较大
- ③ 累计稳定常数较大
- ④ 电离平衡常数较大

7. 配合物 $[\text{ZnY}]^{2-}$ 中 Zn 的配位数为

- ① 1 ② 2 ③ 4 ④ 6

8. 在铜锌原电池中，锌电极是：

- ① 正极 ② 负极 ③ 发生还原反应的极 ④ 阴极

9. 氧化还原反应电对的标准电极电势高:

- ① 氧化态越弱
- ② 还原态越强
- ③ 氧化态浓度越大
- ④ 还原态越弱

10. 下列各组量子数中，正确表达的是：

- ① $n=3, l=3, m=-3$
- ② $n=4, l=4, m=0$
- ③ $n=2, l=1, m=-1$
- ④ $n=0, l=0, m=0$

11. 26 号元素的离子 Fe^{2+} 电子构型是：

- ① $[\text{Ar}]3d^44s^2$
- ② $[\text{Ar}]3d^54s^1$
- ③ $[\text{Ar}]3d^54s^2$
- ④ $[\text{Ar}]3d^64s^2$

12. 碲化氢的分子为：

- ① sp 杂化
- ② sp^3 不等性杂化
- ③ sp^3 杂化
- ④ sp^2 杂化

13. 一溴甲烷分子的空间构型为：

- ① 折线型
- ② 四面体型
- ③ 正四面体型
- ④ 平面三角形

14. 化合物四碘化碳分子为：

- ① 极性键、极性分子
- ② 非极性键、非极性分子
- ③ 极性键、非极性分子
- ④ 非极性键、极性分子

15. 化合物 HCN 分子之间存在

- ① 色散、诱导、取向力和氢键
- ② 色散、诱导和氢键
- ③ 诱导、取向力和氢键
- ④ 色散、诱导和取向力

二、计算题

1. 配制 1.0L $\text{pH}=9.8$, $c(\text{NH}_4^+)=0.10\text{mol/L}$ 的缓冲溶液，需用 6.0mol/L $\text{NH}_3\cdot\text{H}_2\text{O}$ ($K_b^\ominus=1.74\times 10^{-5}$) 多少毫升和固体 $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$ (摩尔质量为 132g/mol) 多少克？

2. 在 298K 和 101kPa 下， $\text{N}_2\text{O}_4(\text{g})=2\text{NO}_2(\text{g})$ 反应达平衡时， N_2O_4 的分解率为 20% ，求平衡是 N_2O_4 和 NO_2 的分压值及值 $K^\ominus$ 。

$p(\text{N}_2\text{O}_4)=34\text{kPa}$, $p(\text{NO}_2)=67\text{kPa}$, $K^\ominus=1.32$

三、填空题 (共 17 分)

元素名称	元素符号	原子序数	元素的电子结构式 (原子实法)	周期表中			最高正价
				周期	族	区	
碘	I	53	$[\text{Kr}]5s^25p^5$	5	VII A	p	+7

铬	Cr	24	[Ar]3d ⁵ 4s ²	4	VI B	d	+6
锑	Sb	51	[Kr]5s ² 5p ³	5	VA	p	+5
锌	Zn	50	[Ar]3d ¹⁰ 4s ²	4	II B	ds	+2
锶	Sr	38	[Kr]5s ²	5	II A	s	+2

四、填空（共 38 分）

- 光化学烟雾在夏秋季节发生，按氧化还原性来分，属于氧化性性烟雾。
- 伦敦型烟雾的二次污染物是硫酸雾、硫酸盐。
- 世界上酸雨区主要分布在欧洲、北美、中国。
- 世界上 CO₂、CH₄、CFC11 CFC12、N₂O 的上空出现了臭氧洞。
- 对全球变暖影响最大的前四号温室气体依次是南极、北极、青藏高原
- 某日北京市的空气污染分指数为：二氧化碳 114；一氧化碳 78；臭氧 37；二氧化氮 89；可吸入颗粒物 201。这一天的首要污染物是可吸入颗粒物；空气质量为 IV-1；其描述为中度污染。
- 湖泊富营养化叫做水华；原因在于其中含 N 和含 P 的植物营养物质过多。
- BOD₅ 是指五日生化需氧量。
- 水俣病是由甲基汞的污染造成的。
- 地方性氟中毒的主要病症是氟斑牙、氟骨病。
- *11. 沙尘天气可分为浮尘、扬沙、沙尘暴三类。
- 米糠油事件是多氯联苯污染造成的。
- 比利时污染鸡事件是由二噁英污染造成的。
- 可持续发展的基本原则是公平性原则、持续性原则、共同性原则
- ISO14000 是环境管理系列标准。
- 中国跨世纪绿色工程规划的重点（33211 工程）包括：
三河：淮河、辽河、海河；一市：北京市；一海：渤海；三湖：滇池、巢湖、太湖；
两区：二氧化硫污染控制区、酸雨控制区

《化学与环境》试卷 B (筛选后)

填空题

- 伦敦型烟雾主要在 冬季 发生，按氧化还原性来分，属于 还原性 烟雾
- 光化学烟雾的一次污染物是：碳氢化合物和氮氧化物
- 中国的大气污染以 煤烟型 为主
- 世界上的酸雨区主要分布在：欧洲 北美 中国
- PH 值 <5.6 的降雨属于酸雨
- 酸雨中的主要酸是：硫酸 和 硝酸
- 臭氧洞主要发生在 春季
- 写出三种消耗臭氧层物质：氯氟烃、哈龙、四氯化碳、一氧化二氮
- 由于温室气体吸收地球辐射中的 红外线 产生温室效应
- 痛痛病发生在 日本 国，病因是 镉 在体内积蓄造成 肾损伤 导致骨软化症

空气污染指数与级别		
污染指数 API	空气质量 级别	空气质量 描述
0~50	I	优

51~100	Ⅱ	良
101~150	Ⅲ-1	轻微污染
151~200	Ⅲ-2	轻度污染
201~250	Ⅳ-1	中度污染
251~299	Ⅳ-2	中度重污染
≥300	Ⅴ	重度污染

光化学烟雾：夏季 氧化 一次污染物：碳氢化合物 氮氧化合物

二次污染物：O₃ PAN 醛 酮

伦敦型烟雾：冬季 还原 一次污染物：煤烟 二氧化硫

二次污染物：硫酸雾 硫酸盐

《蒙特利尔协定书》控制 ODS