

方程：

- 1. 求微分方程 $y' = xy$, $y(0) = 1$ 的特解
- 2. 求微分方程 $y'' - 2y' + y = (x^2 + 2)e^x$ 的通解。

级数

- 1. 函数 $f(x) = e^{3x}$ 的麦克劳林级数为_____
- 2. 设函数 $f(x) = \begin{cases} -1, & -\pi < x \leq 0 \\ 1+x^2, & 0 < x \leq \pi \end{cases}$ 是以 2π 为周期的周期函数，其傅立叶级数的和函数记为 $S(x)$, 则 $S(36\pi) =$ _____
- 3. 幂级数 $\sum_{n=1} \frac{(x+1)^{2n}}{2^n}$ 的收敛域为_____
- 4. 求幂级数 $\sum_{n=1} \frac{x^{n+1}}{n}$ 的收敛域及和函数。
- 5. 设 $\frac{a_{n+1}}{a_n} \leq \frac{b_{n+1}}{b_n}$, $(n = 1, 2, 3, \dots, a_n > 0, b_n > 0)$, 证明：若级数 $\sum_{n=1} b_n$ 收敛, 则级数 $\sum_{n=1} a_n$ 也收敛。

多元微分：

- 1. 函数 $z = y^x$ 在点 (1,2) 处的梯度 $\text{grad}z =$ _____
- 2. 求曲面 $xy + ez = 3$ 在点 (1,2,0) 处的切平面方程。
- 3. 设方程 $F(x - 2z, y - 3z) = 0$ 确定了函数 $z = z(x, y)$, 证明：
$$2\frac{\partial z}{\partial x} + 3\frac{\partial z}{\partial y} = 1.$$
- 4. 求函数 $f(x, y) = 3xy - x^3 - y^3$ 的极值。

重积分

1. 求由曲面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 与 $z = 1 + \sqrt{1 - x^2 - y^2}$ 所围立体的体积
2. 设 $D: x^2 + y^2 \leq 1$ ，则二重积分 $\iint_D e^{x^2 + y^2} dx dy =$ _____

线面积分

1. 曲线 L 为 $\mathbf{x^2 + y^2 = 1}$ ，求曲线积分 $\int_L \sqrt{\mathbf{x^2 + y^2}} d\mathbf{s}$
2. 计算曲线积分 $\mathbf{I = \int_L (2xe^y + 1)dx + (x^2e^y + 2x)dy}$ ， L 是 $\mathbf{(x - 1)^2 + y^2 = 1}$ 上半圆周逆时针方向。
3. 设 Σ 为球面 $\mathbf{x^2 + y^2 + z^2 = a^2}$ ，求曲面积分 $\iint_{\Sigma} (z + 1) dS$
4. 计算曲面积分 $\mathbf{I = \iint_{\Sigma} (z^2 - 1)dx dy + x(y^2 - 2z)dy dz + x^2 y dz dx}$ ，其中 Σ 是曲面 $z = 1 - x^2 - y^2 (0 \leq z \leq 1)$ 的上侧。

方程:

1. 求微分方程 $y' = xy$, $y(0) = 1$ 的特解

解: 分离变量 $\frac{dy}{y} = x dx \Rightarrow \ln y = \frac{1}{2}x^2 + C_1$ 即 $y = C e^{\frac{x^2}{2}}$.

代入初值条件 $y(0) = 1$, 有 $1 = C e^0 \Rightarrow C = 1$.

故特解为 $y = e^{\frac{x^2}{2}}$

2. 求微分方程 $y'' - 2y' + y = (x^2 + 2)e^x$ 的通解。

解: ① 求齐次微分方程的通解.

特征多项式 $\varphi(r) = r^2 - 2r + 1$. 特征根 $r_{1,2} = 1$

齐次方程的通解为 $Y = (C_1 + C_2 x)e^x$.

② 求非齐次微分方程的特解.

设 $y^* = x^2(Ax^2 + Bx + C)e^x = Q(x)e^x$. ($\lambda = 1$ 是特征重根).

代入公式 $Q''(x) - 2Q'(x) + Q(x) = P_m(x)$ 得

$$Q''(x) = x^2 + 2$$

$$12Ax^2 + 6Bx + 2C = x^2 + 2$$

$$\Rightarrow A = \frac{1}{12}, C = 1, B = 0.$$

$$\therefore y^* = (\frac{1}{12}x^4 + x^2)e^x$$

③ 非齐次微分方程的通解 $y = Y + y^* = (\frac{1}{12}x^4 + x^2 + C_1 + C_2 x)e^x$.

级数

1. 函数 $f(x) = e^{3x}$ 的麦克劳林级数为 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} (3x)^n$, $x \in (-\infty, +\infty)$

2. 设函数 $f(x) = \begin{cases} -1, & -\pi < x \leq 0 \\ 1+x^2, & 0 < x \leq \pi \end{cases}$ 是以 2π 为周期的周期函数, 其傅立叶级数的

和函数记为 $S(x)$, 则 $S(36\pi) = 0$

3. 幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x+1)^{2n}}{2^n}$ 的收敛域为 $(-\sqrt{2}-1, \sqrt{2}-1)$

4. 求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{n+1}}{n}$ 的收敛域及和函数。

解: (1) $\rho = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{n+1}}{\frac{1}{n}} = 1, R = 1.$

$x = -1$ 时, 原级数变为 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n}$ 收敛. $x = 1$ 时, 原级数发散.
 $\therefore$ 收敛域为 $[-1, 1)$.

(2) 设幂级数的和函数为 $S(x)$. 令 $g(x) = \frac{S(x)}{x}$, 则 $g(0) = 0$.

$$g'(x) = \left(\frac{S(x)}{x} \right)' = \left(\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n} \right)' = \sum_{n=1}^{\infty} x^{n-1} = \frac{1}{1-x} \quad x \in [-1, 1).$$

$$\int_0^x g'(x) dx = \int_0^x \frac{1}{1-x} dx \quad g(x) = -\ln(1-x) \Big|_0^x = -\ln(1-x).$$

故 $S(x) = -x \ln(1-x), [-1, 1)$

5. 设 $\frac{a_{n+1}}{a_n} \leq \frac{b_{n+1}}{b_n}, (n=1, 2, 3, \dots, a_n > 0, b_n > 0)$, 证明: 若级数 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 收敛,

则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 也收敛。

由已知 $\frac{a_{n+1}}{b_{n+1}} \leq \frac{a_n}{b_n} \leq \dots \leq \frac{a_1}{b_1}.$

$$\Rightarrow 0 \leq a_n \leq b_n \cdot \frac{a_1}{b_1} \quad \frac{a_1}{b_1} \text{ 为非零常数.}$$

由比较判别法, 若 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 收敛.

则 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛.

多元微分:

1. 函数 $z = y^x$ 在点 $(1, 2)$ 处的梯度 $\text{grad} z = \underline{\text{del}} (2 \ln 2, 1)$

2. 求曲面 $xy + e^z = 3$ 在点 $(1, 2, 0)$ 处的切平面方程。

解: $F(x, y, z) = xy + e^z - 3$.

$$F'_x|_{(1,2,0)} = 2, \quad F'_y|_{(1,2,0)} = 1, \quad F'_z|_{(1,2,0)} = 1.$$

所求切平面方程为 $2(x-1) + (y-2) + z = 0$

$$\Rightarrow 2x + y + z = 4.$$

3. 设方程 $F(x-2z, y-3z) = 0$ 确定了函数 $z = z(x, y)$, 证明:

$$2 \frac{\partial z}{\partial x} + 3 \frac{\partial z}{\partial y} = 1.$$

解: $F'_x = F'_1, \quad F'_y = F'_2, \quad F'_z = -2F'_1 - 3F'_2$,

$$\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{F'_x}{F'_z} = \frac{F'_1}{2F'_1 + 3F'_2}, \quad \frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{F'_y}{F'_z} = \frac{F'_2}{2F'_1 + 3F'_2}$$

$$2 \frac{\partial z}{\partial x} + 3 \frac{\partial z}{\partial y} = \frac{2F'_1 + 3F'_2}{2F'_1 + 3F'_2} = 1.$$

原式得证.

4. 求函数 $f(x, y) = 3xy - x^3 - y^3$ 的极值。

解: ① 求驻点:

$$\begin{cases} f'_x = 3y - 3x^2 = 0 \\ f'_y = 3x - 3y^2 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x=0 \\ y=0 \end{cases}, \quad \begin{cases} x=1 \\ y=1 \end{cases}.$$

$$\textcircled{2} f''_{xx} = -6x, \quad f''_{xy} = 3, \quad f''_{yy} = -6y.$$

③ 在点 $(0, 0)$ 处, $A = 0, B = 3, C = 0$.

$$AC - B^2 = -9 < 0.$$

故 $f(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 处无极值.

在 $(1, 1)$ 点处, $A = -6, B = 3, C = -6$.

$$AC - B^2 = 27 > 0, \quad \text{且 } A = -6 < 0.$$

故 $f(x, y)$ 在 $(1, 1)$ 有极大值, 即 $f(1, 1) = 1$.

重积分

1. 求由曲面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 与 $z = 1 + \sqrt{1 - x^2 - y^2}$ 所围立体的体积

体积为 $\iiint_{\Omega} 1 dv$.


$$= \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 r dr \int_r^{1+\sqrt{1-r^2}} dz$$

$$= \pi$$

选用柱坐标

$$\begin{cases} r \leq z \leq 1 + \sqrt{1-r^2} \\ 0 \leq r \leq 1 \\ 0 \leq \theta \leq 2\pi \end{cases}$$

$$dv = r dr d\theta dz$$



2. 设 $D: x^2 + y^2 \leq 1$, 则二重积分 $\iint_D e^{x^2+y^2} dx dy =$ _____

选用极坐标

$$\iint_D e^{x^2+y^2} dx dy$$

$$\begin{cases} 0 \leq r \leq 1 \\ 0 \leq \theta \leq 2\pi \end{cases}$$

$$d\sigma = r dr d\theta$$

$$= \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 e^{r^2} r dr$$

$$= (e-1)\pi$$

线面积分

1. 曲线 L 为 $x^2 + y^2 = 1$, 求曲线积分 $\int_L \sqrt{x^2 + y^2} ds$

$$\int_L \sqrt{x^2 + y^2} ds = \int_L 1 ds = 2\pi.$$

2. 计算曲线积分 $I = \int_L (2xe^y + 1)dx + (x^2e^y + 2x)dy$, L 是 $(x-1)^2 + y^2 = 1$

上半圆周逆时针方向。

(1) 补直线 $BA: y=0, x: 0 \rightarrow 2$.


$$I + \int_{BA} (2xe^y + 1)dx + (x^2e^y + 2x)dy$$

$$\stackrel{\text{格林公式}}{=} \iint_D (2xe^y + 2 - 2xe^y) d\tau$$

$$= 2 \iint_D 1 d\tau = 2 \cdot \frac{1}{2} \pi \cdot 1^2 = \pi.$$

$$(2) \int_{BA} = \int_0^2 (2xe^0 + 1)dx = (x^2 + x)|_0^2 = 6$$

$$(3) I = \pi - 6$$




3. 设 Σ 为球面 $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$, 求曲面积分 $\iint_{\Sigma} (z+1) dS$

$$\begin{aligned} \iint_{\Sigma} (z+1) dS &= \iint_{\Sigma} z dS + \iint_{\Sigma} 1 dS \\ &= \underline{0} + \underline{4\pi a^2} \\ &\quad \text{对称性} \quad \text{球面面积} \end{aligned}$$

4. 计算曲面积分 $I = \iint_{\Sigma} (z^2 - 1) dx dy + x(y^2 - 2z) dy dz + x^2 y dz dx$, 其中 Σ 是曲面

$z = 1 - x^2 - y^2$ ($0 \leq z \leq 1$) 的上侧。

(1) 补面: $z=0, x^2+y^2 \leq 1$, 取下侧. 记为 Σ_1 .



$$\begin{aligned} I + \iint_{\Sigma_1} & \\ \text{高斯公式} & \iint_{\Sigma} (2z + y^2 - 2z + x^2) dv \\ &= \iint_{\Sigma} (x^2 + y^2) dv \end{aligned}$$

$$\Omega: \begin{cases} 0 \leq z \leq 1 - r^2 \\ 0 \leq r \leq 1 \\ 0 \leq \theta \leq 2\pi \end{cases}$$

$$dv = r dr d\theta dz$$

$$\begin{aligned} \text{选用柱坐标} & \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 r dr \int_0^{1-r^2} r^2 dz \\ &= 2\pi \int_0^1 r^3 (1 - r^2) dr \\ &= \frac{\pi}{6} \end{aligned}$$

$$(2) \iint_{\Sigma_1} = \iint_{D_{xy}} (-1) \cdot (-dx dy) = \iint_{D_{xy}} dx dy = \pi \cdot 1^2 = \pi.$$

$$(3) I = \frac{\pi}{6} - \pi = -\frac{5}{6}\pi.$$