

北工大 2016-2017 学年度第二学期 高数期中考试 真题

北京工业大学 2016—2017 学年第二学期
《高等数学(工)—2》期中考试试卷

学号: _____ 姓名: _____ 成绩: _____

一、填空题 (本大题共 8 小题, 每小题 5 分, 共 40 分)

1. 函数 $z = \ln \sqrt{x^2 + y^2}$ 在点 (1,1) 的全微分为 $\frac{1}{2} dx + \frac{1}{2} dy$
2. $xy + yz + zx = 3$ 确定了 $z = z(x, y)$, 则 $\left. \frac{\partial z}{\partial y} \right|_{(1,1)} = -1$
3. 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n!}$ 的和为 $e - 1$
4. 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{\ln n}{n}$ 的敛散性是 条件收敛 (若收敛, 需指出是绝对收敛还是条件收敛)
5. 函数 $f(x) = \frac{1}{1+x}$ 在 $x=1$ 处的泰勒级数展开式为 $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{2^{n+1}} (x-1)^n$ $x \in (-1, 3)$
6. 幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x+1)^{2n}}{3^n + n^2}$ 的收敛域为 $(-\sqrt{3}-1, \sqrt{3}-1)$
7. 微分方程 $x \ln x dy + y dx = 0$ 的通解是 $y = \frac{c}{\ln x}$
8. 设 $f(x) = \begin{cases} 1+x^2 & 0 \leq x < \pi \\ 0 & -\pi \leq x < 0 \end{cases}$, $S(x)$ 是其傅立叶级数的和函数, 则 $S(6\pi) = \frac{1}{2}$

二、计算题 (本大题共 5 小题, 每小题 10 分, 共 50 分)

9. $F(xz, xy, yz) = 0$ 确定 z 为 x, y 的函数, 且 $F(u, v, w)$ 可微, 求 $\frac{\partial z}{\partial y}$.

解 方程两边对 y 求偏导:

$$F_1' \left(x \frac{\partial z}{\partial y} \right) + F_2' x + F_3' (z + y \frac{\partial z}{\partial y}) = 0$$

$$(F_1' x + F_3' y) \frac{\partial z}{\partial y} = -F_2' x - F_3' z$$

$$\frac{\partial z}{\partial y} = - \frac{F_2' x + F_3' z}{F_1' x + F_3' y}$$

$G(x, y, z) = F_1$
 $\frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = - \frac{F_{12}'}{G_2'}$

第 1 页 共 4 页

10. 求微分方程 $y'' + 2y' - 3y = (x^2 + 1)e^{-3x}$ 的通解。

解: 先求 $y'' + 2y' - 3y = 0$ 的通解

$$r_1 = -3, r_2 = 1, y = C_1 e^{-3x} + C_2 e^x$$

令方程的通解 $y = Q(x)e^{-3x}$ 代入

$$Q'' - 4Q' = x^2 + 1$$

设 $Q' = ax^2 + bx + c$ 则 $Q'' = 2ax + b$ 代入

$$a = -\frac{1}{4}, b = -\frac{1}{8}, c = -\frac{9}{32}$$

$$\text{所以 } Q' = -\frac{1}{4}x^2 - \frac{1}{8}x - \frac{9}{32}$$

$$Q = -\frac{1}{12}x^3 - \frac{1}{16}x^2 - \frac{9}{32}x$$

$$\text{通解 } y = C_1 e^{-3x} + C_2 e^x - e^{-3x} \left(\frac{1}{12}x^3 + \frac{1}{16}x^2 + \frac{9}{32}x \right)$$

11. 求幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2n+1} (x-2)^n$ 的收敛域, 并计算级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)2^n}$

解: 收敛域为 $[1, 3]$

$$S(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2n+1} (x-2)^n$$

$$\int_0^x S(x) dx = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2n+1} \frac{(x-2)^{n+1}}{n+1}$$

$$\text{则 } S'(x) = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^{2n} = \frac{1}{1+x^2}$$

$$S(x) = \arctan x$$

$$S(\sqrt{2}/2) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2n+1} \left(\frac{\sqrt{2}}{2} \right)^{2n+1} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$\text{所以 } \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)2^n} = \sqrt{2} \arctan \left(\frac{\sqrt{2}}{2} \right)$$

12. 将函数 $f(x) = x^5 \sin x$ 展开成麦克劳林级数, 并计算 $f^{(100)}(0)$, $f^{(101)}(0)$.

解: $\sin x = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!}$ -3'

$x^5 \sin x = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+6}}{(2n+1)!}$ 根据泰勒级数展开式

$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(0)}{n!} x^n$ -3' $2n+6=100 \Rightarrow n=47$

$\frac{f^{(100)}(0)}{100!} = (-1)^{47} \cdot \frac{1}{95!}$

$\frac{f^{(100)}(0)}{2} = -\frac{100!}{95!} \quad \frac{f^{(101)}(0)}{2} = 0$

13. 求微分方程 $\frac{dy}{dx} + \frac{y}{x} = \frac{\sin x}{x}$ 满足初始条件 $y(\pi) = 1$ 的特解.

解: 先解齐次方程

$\frac{dy}{y} = -\frac{dx}{x}$

$\ln y = -\ln x + C$

$y = \frac{C}{x}$ -3'

令 $y = C(x)/x$, 代入原方程

$C'(x) = \sin x$

$C(x) = -\cos x + C$

所以通解为 $y = \frac{C - \cos x}{x}$ -3'

当 $x = \pi$ 时 $y(\pi) = \frac{C+1}{\pi} = 1, C = \pi - 1$

所以特解为 $y = \frac{\pi - 1 - \cos x}{x}$ -2'

三、证明题 (本大题共 2 小题, 每小题 5 分, 共 10 分)

14. 设 $u(x, y) = f(x+y) + \int_0^{x-y} g(t) dt$, 其中 f, g 二阶可导, 证明: $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = \frac{\partial^2 u}{\partial y^2}$

解: $\frac{\partial u}{\partial x} = f'(x+y) + g(x-y)$ 2'

$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = f''(x+y) + g'(x-y)$ 1'

$\frac{\partial u}{\partial y} = f'(x+y) - g(x-y)$ 1'

$\frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = f''(x+y) + g'(x-y)$ 1' □

15. 已知函数 $f(x) \geq 0$ 且 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = 0$, 证明: 当常数 $\alpha > 0$ 时,

级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^\alpha} f\left(\frac{1}{n}\right)$ 收敛.

证: 根据 n 级数的极限形式 2'

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{n^\alpha} f\left(\frac{1}{n}\right)}{\frac{1}{n^{\alpha+1}}} = \frac{f\left(\frac{1}{n}\right)}{\frac{1}{n}} = 0 \quad 3'$$

所以 $\sum \frac{1}{n^\alpha} f\left(\frac{1}{n}\right)$ 与 $\sum \frac{1}{n^{\alpha+1}}$ 的敛散性相同.

收敛.